

2. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelethez

A kiemelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

4. Myasthenia gravisban (BNO: G70) szenvedő beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos az alábbi gyógyszereket:

11. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedő beteg részére a neurológus, vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket:

3. számú melléklet a 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelethez

Az emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriába tartozó betegcsoportok, indikációs területek és a felírásra jogosultak köre

Emelt, indikációhoz kötött támogatással rendelheti:

A) Eü 90 százalékos támogatási kategória

5. a) 1. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedő beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket:

5. a) 2. Epilepsziában (BNO: G40.9) szenvedő az 5. a) 1. pontban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket:

5. a) 3. Epilepsziában szenvedő (BNO: G40.9) az 5. a) 1.-5. a) 2. pontokban felsorolt szerekre dokumentáltan rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos, házi gyermekorvos az alábbi gyógyszereket:

5. b) 1. Lennox-Gastaut szindróma (BNO: G40.4) kezelésére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az alábbi gyógyszereket:

5. b) 2. Lennox-Gastaut (BNO: G40.4) szindróma kezelésére a biperidenre és procyclidinre dokumentáltan terápia rezisztens beteg részére a neurológus vagy gyermekneurológus szakorvos maximum hat hónapig az alábbi gyógyszereket:

7. c) Tic zavar (BNO: F95.2) diagnózisa esetén a pszichiáter vagy gyermekpszichiáter szakorvos vagy javaslatuk alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos az alábbi gyógyszereket:

8. Az adott készítmény alkalmazási előírásában szereplő neurológiai javallatokban (BNO: G00-G99) a neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a házi orvos az alábbi gyógyszereket:

B. Eü 70 százalékos támogatási kategória

2. a) 1. Lezajlott tranziens ischemias attack (TIA) (BNO: G45), illetve stroke (BNO: I63) után halmozott atherothrombotikus rizikóval rendelkező beteg részére secunder stroke prevenció céljából a neurologus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított hat hónapig - a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

15. Meniere-szindrómában (BNO: H81.0) szenvedő beteg részére a fül-orr-gégész vagy neurológus szakorvos vagy javaslata alapján - a javaslat keltétől számított három hónapig - a háziorvos az alábbi gyógyszereket:

18. Bizonyítottan meddő nők in vitro fertilizációs kezeléséhez (BNO: N97) a meddőség kezelésére kijelölt intézmény szülész-nőgyógyász szakorvosa az alábbi gyógyszereket: